

Dla każdego z poniższych rozkładów:

- a. sprawdzić, czy jest to rozkład z rodziny wykładniczej;
- b. podać model statystyczny próby  $X_1, \dots, X_n$ ;
- c. wyznaczyć statystykę dostateczną;
- d. podać rozkład statystyki dostatecznej;
- e. wyznaczyć ENMW nieznanymi parametrami;
- f. wyznaczyć ENW nieznanymi parametrami;
- g. podać kilka przykładów rzeczywistych zjawisk modelowanych danym rozkładem.

---

**1. Rozkład dwupunktowy  $D(p)$**

.....

**2. Rozkład dwumianowy  $B(n, p)$  ( $n$  dane)**

.....

**3. Rozkład geometryczny  $G(p)$**

.....

**4. Rozkład ujemny dwumianowy  $NB(r, p)$  ( $r$  dane)**

.....

**5. Rozkład Poissona  $Po(\lambda)$**

.....

**6. Rozkład hipergeometryczny  $H(N, n, M)$  ( $N, n$  dane)**

.....

**7. Rozkład beta  $\beta(a, b)$**

.....

**8. Rozkład wykładniczy  $W(\lambda)$**

.....

**9. Rozkład gamma  $\Gamma(\alpha, \lambda)$**

.....

**10. Rozkład normalny  $N(\mu, \sigma^2)$**

.....

W poniższych zadaniach podanych poniżej obowiązują standardowe założenia modeli liniowych. Należy:

- a. podać macierzową formę modelu;
- b. znaleźć EMNK wektora nieznanymi parametrów;
- c. znaleźć EMNK wariancji błędu;
- d. znaleźć rozkłady wyznaczonych estymatorów;
- e. znaleźć zbiór estymowalnych liniowych funkcji parametrów;
- f. znaleźć EMNK funkcji  $c'\beta$  dla estymowalnej funkcji  $c$ ;

---

1.  $Y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, \quad j = 1, 2, \dots, n$

.....

2.  $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, a, \quad j = 1, 2, \dots, n$

.....

3.  $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ijk}, \quad i = 1, 2, \dots, a, \quad j = 1, 2, \dots, b, \quad k = 1, 2, \dots, n$

.....

4.  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$

.....

5.  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$

.....

6.  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$

.....